



Presidencia de la República
U R U G U A Y

V Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Hogares

Mayo 2012



Aspectos Técnico - Metodológicos

Población: Personas de 15 a 65 años residentes en localidades de 10.000 y más habitantes

Instrumento: Encuesta

Método de recolección: Cara a cara


Tipo de cuestionario: Cerrado

Lugar de recolección: Hogares

Tamaño de la muestra: 5000 encuestas efectivas

Relevamiento de datos: setiembre a noviembre 2011

Características del escenario.



Definición de principales indicadores

PREVALENCIA DE VIDA: ¿Has consumido alguna vez en la vida x sustancia?

PREVALENCIA ÚLTIMOS 12 MESES: ¿Has consumido en los últimos 12 meses x sustancia?

PREVALENCIA ÚLTIMOS 30 DÍAS: ¿Has consumido en los últimos 30 días x sustancia?

INCIDENCIA: Mide la proporción de personas que probaron por primera vez en el último año la sustancia indagada.


CONSUMO PROBLEMÁTICO: Serie de Indicadores resumidos en un INDICE que mide los síntomas de dependencia (física o psicológica) o uso abusivo de la persona a la sustancia indagada (CIE-10) para drogas ilegales, AUDIT para Alcohol.

ABUSO POR INGESTA (PARA ALCOHOL): Consumo en una sola ingesta superior a 4 tragos (equivalente a 80 o mas gramos de alcohol puro.)


ALCOHOL

Los hombres consumen en mayor medida que las mujeres, excepto en los menores de 18 años donde el consumo se equipara entre los sexos.

Magnitud del consumo Alcohol (%)



Evolución prevalencias 2001-2011 (%)




Se presenta un aumento significativo del consumo de alcohol respecto al 2006.

ALCOHOL

Edad promedio de inicio según sexo y edad

La edad promedio de inicio en estos jóvenes es de 13,82.




La edad promedio de inicio del consumo de alcohol es 16,6 años

PROBLEMAS:

• **Mayores probabilidades de uso problemático y dependencia al alcohol;** Grant y Dawson (1997) aseguran que cerca del 40% de los que reportaron haber comenzado a beber antes de los 15 años describieron que en algún momento de sus vida llegaron a tener dependencia al alcohol, lo cual es una cifra cuatro veces superior a la reportada por quienes empezaron a beber a los 21 años .

ALCOHOL

260.000 personas entre 15 y 64 años presentan uso problemático de alcohol.



Riesgo I - Uso problemático por episodios puntuales de abuso por ingesta sobre el nivel de intoxicación

Riesgo II - Uso problemático por ingestas habituales y/o puntuales igual o superior a cinco tragos; no presentando resultado positivo en la escala AUDIT.


Riesgo III - Uso problemático identificado por valores positivos en la escala AUDIT y donde en la mayoría de los casos además se presentan ingestas puntuales y habituales sobre el nivel de intoxicación

TABACO


Magnitud consumo Tabaco (%)

Incidencia:

- Casi el 60% son mujeres.
- Rango de edad predominante: 15 a 25 años.



Evolución prevalencias 2001-2011



El descenso en el consumo habitual es estadísticamente significativo, lo que se explica por el descenso del consumo de los hombres.

El rango de edad que muestra mayor cesación tabáquica es el de 36 a 45 años.

Uso de medicamentos.

Los tranquilizantes son la tercera droga mas consumida, con una prevalencia de vida del 16%.

Prevalencia de vida tranquilizantes


	%
Si	16,0
No	84,0
Total	100

Base: Total de la muestra.

Prevalencia de vida tranquilizantes según prescripción médica

Le fueron recetados	85,9%
Por su cuenta	12,4 %
Primero recetados y luego por su cuenta	1,7%

Consumo de tranquilizantes (con y sin prescripción médica) según sexo y edad.



Profesional que indicó los tranquilizantes

	%
Medicina General	42,7
Médico psiquiatra	42,3
Otras especialidades	15,0
Total	100

se: consumidores de tranquilizantes bajo prescripción.

Uso de medicamentos.

El 4,6% de la población declara que ha consumido hipnóticos (con y sin prescripción) alguna vez en su vida; en tanto un 6,6% consumió antidepresivos (101.000 personas) y el 0,7% estimulantes.

Prevalencia de vida (con y sin prescripción médica) según sexo y edad.


	Hombre	Mujer	≤35 años	>35 años
Hipnóticos	3,4	5,8	2,5	5,8
Antidepresivos	3,3	9,5	3,4	8,3
Estimulantes	0,3	1,0	0,2	0,9

Base: Total de la muestra.


MARIHUANA

El 8,3% de la población representada ha consumido Marihuana en los últimos 12 meses (128.000 personas)

Prevalencias Marihuana (en %)




Evolución del consumo



Prevalencias año en el Mundo	%
Europa	6,7
Región (Argentina, Chile)	7,2 – 6,7
Usa	13,7

MARIHUANA

Consumo de marihuana. Prevalencia de vida según sexo y tramo de edad.




De cada 10 personas que probaron la sustancia, cuatro mantienen el consumo en el último año.

Un 25,1% de los que probaron marihuana alguna vez en la vida tiene actualmente un patrón de consumo frecuente.

Otro 58,6%, no ha consumido en el último año.

MARIHUANA


El 16,6% de los consumidores del último año presentan signos de uso problemático (21.000 personas aproximadamente).



A igual frecuencia de consumo, mayor uso problemático en las mujeres.

COCAÍNA


Prevalencia Cocaína (%)



Un 13,4% de los que probaron cocaína alguna vez en la vida tiene actualmente un patrón de consumo frecuente.

Otro 68,7% no ha consumido en el último año.

Prevalencias año en el Mundo	%
Europa	1.2
Región (Argentina, Chile)	2.4-2.6
Usa	2.4



SÓLO LA EXPERIMENTACIÓN TUVO UN CRECIMIENTO ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO ENTRE 2006 Y 2011

COCAÍNA

El consumo de cocaína se da mayormente en hombres, residentes en Montevideo y menores de 35 años de edad.

El 34% de los que consumieron cocaína en el último año presenta signos de dependencia, lo que representa a 10.204 usuarios.


% de consumidores problemáticos según frecuencia de consumo.

	%
Ocasional / experimental	22.3
Frecuente	49.7

PASTA BASE

El consumo de pasta base permanece estable en población general. No se presentan diferencias estadísticamente significativas respecto a la primera medición del año 2006.

Prevalencia PBC (en %)



Alta concentración geográfica y socioeconómica

Montevideo.
secciones censales según prevalencia vida pasta base.



El consumo de pasta base en la región(*):

- La prevalencia de vida del consumo de pasta base en las Américas –población general- oscila entre el 0,14% y el 3,10%.
- Uruguay presenta valores inferiores a Chile y similares a Colombia, Perú y Ecuador.

(*) Fuente: Informe del Uso de Drogas en las Américas., 2011, OEA - CICAD

PASTA BASE

Perfil del consumidor

- 2,0% hombres versus 0,4 mujeres
- Mayoritariamente menores de 30 años.
- 18,9 años edad de inicio promedio
- Policonsumidores.



LA MITAD DE LOS CONSUMIDORES DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES PRESENTA USO PROBLEMÁTICO.

Un 19,3% de los que probaron pasta base alguna vez en la vida tiene actualmente un patrón de consumo frecuente. Otro 68,4% no ha consumido en el último año.

Censo nacional de usuarios de drogas en tratamiento – OUD- 2010

Sustancia	%
PBC	63
Cocaína	18
Alcohol	9,6
Marihuana	6,1
Otras drogas	2,9
s/d	0,4
TOTAL	100

OTRAS DROGAS


Consumo experimental de otras sustancias, fundamentalmente en usuarios policonsumidores.

	Prevalencia vida
Hashis	3,0
Alucinógenos	2,3
Inhalantes	1,5
Extasis	1,5
Anfetaminas	1,0
Ketamina	0,6
Crack	0,4
Heroína	0,2
Morfina (spm)	0,2
Metanfetaminas	0,2
Opio	0,1
Otras	0,2

Drogas en el territorio

Al igual que la PBC, el consumo de éxtasis presenta una importante segmentación territorial y socioeconómica, en este caso presentando mayores tasas de consumo en los segmentos mas altos.

Montevideo.
secciones censales según prevalencia vida pasta base.



prevalencia vida pasta base (%)

0-12
13-2
3-4

Montevideo.
secciones censales según prevalencia de vida éxtasis.



prevalencia vida éxtasis (%)


0-2
3-39
4-67

SINTESIS: Consumo alguna vez en la vida

- El 95,7% probó alguna vez en la vida alguna droga (legal y/o ilegal)

Una de cada cuatro personas de la población representada probó alguna droga ilegal en su vida. De éstos seis de cada diez (64,2%) son monoconsumidores.


Consumo alguna vez en la vida según cantidad de sustancias. (%)



Base: consumidores últimos 12 meses

SINTESIS: Consumo de drogas en los últimos 12 meses (%)

Las drogas más consumidas en la población de 15 y 64 años son el **alcohol y el tabaco** seguidas de **tranquilizantes y marihuana**.



informe completo en
www.infodrogas.gub.uy



Quinta Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas.
Informe de Investigación.
Mayo 2011

